



Vemurafenib (Zelboraf®)

Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär » hoch-dosiert

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Alexanderplatz 1
10178 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Hermann Einsele

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0
Telefax: +49 (0)30 27 87 60 89 - 18

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, high dose.....	2
---	----------

Vemurafenib (Zelboraf®)

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär » hoch-dosiert

Stand: September 2020

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, high dose

Vemurafenib, relapsed/refractory, high dose

onkopedia				Appraisal													
Facts				Appraisal													
Parameter	Results ¹¹	HR ¹²	p value	Evidence (LoE)													
RR ²	98			5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a	Clinical benefit (ESMO MCBS)				
RFS ¹⁰	19.3												1	2	3	4	5
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ■ curative ■ non-curative </div>													
Patients	untreated																
Trial	Combined analysis of 2 single-arm phase 2 trials																
Randomisation	:																
N ¹	49																
New Therapy	Vemurafenib 960 mg bid																
Control																	
Publication	DOI:10.1056/NEJMoa1506583																

Legende:

¹ N - number of patients

² RR - remission rate, in %

¹⁰ RFS - Relapse-Free Survival

¹¹ results for control, results for new therapy

¹² hazard ratio for new therapy