

arzneimittel



Eltrombopag

Immunthrombozytopenie (ITP) » rezidiert/refraktär

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Alexanderplatz 1
10178 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Lorenz Trümper

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0
Telefax: +49 (0)30 27 87 60 89 - 18

info@dgho.de
www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1	Eltrombopag, ITP, relapsed/refractory.....	2
----------	---	----------

Eltrombopag

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Immunthrombozytopenie (ITP) » rezidiert/refraktär

Stand: November 2020

1 Eltrombopag, ITP, relapsed/refractory

Eltrombopag, ITP, relapsed/refractory

onkopedia		Facts	Appraisal	EU Approval 2010									
Parameter	Results¹⁴	HR¹⁵	p value										
SR ¹¹	10 vs 60		p < 0.0001	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">5</td> <td style="width: 10%;">4</td> <td style="width: 10%;">3b</td> <td style="width: 10%;">3a</td> <td style="width: 10%;">2c</td> <td style="width: 10%;">2b</td> <td style="width: 10%;">2a</td> <td style="width: 10%; background-color: black;">1b</td> <td style="width: 10%;">1a</td> </tr> </table>	5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a
5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a					
OR ¹²	28 ¹⁹ vs 79 ¹⁹		p < 0.0001	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1</td> <td style="width: 20%;">2</td> <td style="width: 20%;">3</td> <td style="width: 20%;">4</td> <td style="width: 20%;">5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5									
				<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> ■ curative</div> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> ■ non-curative </div>									
Patients	Relapsed / refractory												
Trial	Phase 3												
Randomisation	2 : 1												
N¹	197												
New Therapy	Eltrombopag 50 mg												
Control	Standard of Care												
Publication	DOI:10.1016/S140-6736(10)60959-2												

Legende:

¹ N - number of patients

¹¹ SR - sustained response

¹² OR - overall response

¹⁴ results for control, results for new therapy

¹⁵ hazard ratio for new therapy

¹⁹ platelets ≥50x10⁹/L in the first 6 weeks and at least once thereafter