



Gemtuzumab Ozogamicin (Mylotarg®)

Akute Myeloische Leukämie (AML) » erster Rezidiv

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Gemtuzumab Ozogamicin, AML, first relapse.....	2
---	----------

Gemtuzumab Ozogamicin (Mylotarg®)

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Akute Myeloische Leukämie (AML) » erster Rezidiv

Stand: Januar 2021

1 Gemtuzumab Ozogamicin, AML, first relapse

Gemtuzumab Ozogamicin, AML, first relapse

onkopedia				Facts	Appraisal	EU Approval Off-label
Parameter	Results ¹⁴	HR ¹⁵	p value	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 543b3a2c2b2a1b1a </div>		
RR ²	26 ¹⁹			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px; background-color: black;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>		
OS ⁵	4.9			<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 12345 </div>		
				<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> 12345 </div>		
				<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: x-small;"> ■ curative ■ non-curative </div>		
Patients	AML, first relapse					
Trial	Summary of 3 phase II trials					
Randomisation	- : -					
N ¹	277					
New Therapy	Gemtuzumab Ozogamicin					
Control						
Publication	DOI:10.1002/cncr.21326					

Legende:

¹ N - number of patients

² RR - remission rate, in %

⁵ OS - overall survival in months

¹⁴ results for control, results for new therapy

¹⁵ hazard ratio for new therapy

¹⁹ Complete Remission Rate (CR + CRp)