

Leitlinienreport - Magenkarzinom Version 2023.5

1. Informationen zum Leitlinienreport

Diese Leitlinie wurde in Übereinstimmung mit dem, von den verantwortlichen Fachgesellschaften für ONKOPEDIA erstellten Regelwerk erarbeitet, <https://www.onkopedia.com/de/hinweise>. Die relevante Literatur wurde von den Experten ausgewählt. Quellen sind vor allem die Recherche-Datenbanken Medline (über Pubmed), Cochrane Library und Embase (über Ovid), sowie Übersichtsartikel und publizierte Leitlinien unabhängiger Organisationen. Empfehlungen sind in Textform und in Algorithmen dargestellt. Das Manuskript wurde in einem unabhängigen Peer-Review-Verfahren überprüft.

1. 1. Autorinnen und Autoren der Leitlinie

Florian Lordick, Salah-Eddin Al-Batran, Dirk Arnold, Markus Borner, Christiane J. Bruns, Wolfgang Eisterer, Gerhard Faber, Ines Gockel, Dieter Köberle, Sylvie Lorenzen, Markus Möhler, Ron Pritzkeleit, Michael Stahl, Peter Thuss-Patience, Ewald Wöll, Thomas Zander

Koordinator der Leitlinie: Georg Maschmeyer

1. 2. Herausgeber

DGHO	Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie
OeGHO	Österreichische Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie
SGH-SSH	Schweizerische Gesellschaft für Hämatologie
SGMO	Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

1. 3. Finanzierung der Leitlinie

Die Finanzierung der Leitlinie erfolgt ausschließlich durch die verantwortlichen Fachgesellschaften.

2. Ablauf

Beginn der Leitlinienerstellung / Aktualisierung	02/23
Nominierung der Experten durch die Fachgesellschaften	03/23
Erstellung der ersten Version	03/23
Diskussion der ersten Version mit allen Experten	03/23
Erstellung der Konsensversion	04/23
Diskussion der Konsensversion mit allen Experten	04/23
Erstellung der finalen Version	05/23
Redaktionelle Anpassung	05/23
Veröffentlichung	05/23

3. Überarbeitung / Änderungen

3.1. Inhaltlich relevante Änderungen gegenüber der Vorversion

- Trastuzumab-Deruxtecan erhält EU-Zulassung zur Behandlung HER2-positiver fortgeschrittener Karzinome des Magens und des ösophago-gastralen Übergangs nach vorangegangener Behandlung mit einem Trastuzumab-basierten Therapieschema. Der Onkopedia-Behandlungsalgorithmus für die zweite und dritte Therapielinie wurde angepasst
- Pembrolizumab erweist sich als wirksam in Kombination mit einer Platin-Fluoropyrimidin Erstlinien-Chemotherapie bei nicht vorbehandelten HER2-negativen fortgeschrittenen Karzinomen des Magens und des ösophago-gastralen Übergangs. Dies gilt insbesondere bei einer PD-L1 Expression CPS ≥ 10 .
- Zolbetuximab erweist sich als wirksam in Kombination mit einer Oxaliplatin-Fluoropyrimidin Erstlinien-Chemotherapie bei nicht-vorbehandelten HER2-negativen fortgeschrittenen Karzinomen des Magens und des ösophago-gastralen Übergangs. Dies gilt bei einer Claudin18.2-Tumorzellpositivität $\geq 75\%$. Die Substanz steht noch nicht therapeutisch zur Verfügung. Die Onkopedia-Experten schätzen die Daten aber als Praxis-verändernd für die Behandlung von Patientinnen und Patienten (Pat.) mit fortgeschrittenem nicht-vorbehandeltem Adenokarzinom des Magens und ösophago-gastralen Übergangs ein.

3.2. Automatisiertes Änderungsdocument

Über nachfolgenden Link können Sie alle vorgenommenen Änderungen nachverfolgen. Das System vergleicht die aktuell veröffentlichte Leitlinie mit der letzten archivierten Fassung.

Der rot durchgestrichene Text stellt dabei die Textpassagen dar, die aus der aktuellen Version entfernt wurden, grün markierter Text wurde hinzugefügt. Grafiken, die entfernt wurden, erkennt man an einer roten Umrandung, neue Abbildungen sind grün umrandet. Änderungen in Algorithmen und Pfaden können derzeit nicht angezeigt werden.

[Link zur automatischen Änderungsverfolgung](#)