onkopedia

Das Leitlinienportal

Online und als App

www.onkopedia.com

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR
HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

**DGHO-Mitglied
werden - für vollen Zugriff
auf alle Onkopedia-Inhalte
www.dgho.de/mitglied-werden**

Onkopedia – Online-Seminar
23.08.2024

Erstlinientherapie des Hodgkin- Lymphoms

Peter Borchmann, Köln

Offenlegung Interessenskonflikte

1. Anstellungsverhältnis oder Führungsposition

2. Beratungs- bzw. Gutachtertätigkeit

Takeda Oncology, BMS, Roche, Amgen, Novartis, Miltenyi Biotech, Gilead, MSD

3. Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien oder Fonds

4. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz

5. Honorare

Takeda Oncology, Novartis, BMS, Roche, MSD, Celgene, Miltenyi Biotech, Gilead, Abbvie, Incyte

6. Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen

Takeda Oncology, MSD, Novartis, Incyte

7. Andere finanzielle Beziehungen

8. Immaterielle Interessenkonflikte

Subtypen des Hodgkin Lymphoms

Classical Hodgkin Lymphoma (HL), CD30+ & PD-L1+

Diagnostik

Untersuchung	Anmerkungen
Anamnese	<ul style="list-style-type: none"> – B-Symptome – Fieber – Nachtschweiß (mit Wechsel der Wäsche) – ungewollter Gewichtsverlust (<10% des KG in 6 Monaten)
körperliche Untersuchung	<ul style="list-style-type: none"> – Tastbare Lymphknoten – Hepatosplenomegalie
Laboruntersuchungen	<ul style="list-style-type: none"> – Blutbild mit Differenzialblutbild – BSG – LDH, GOT, GPT, AP, Gamma GT, Harnsäure, Kreatinin
Bildgebung	<ul style="list-style-type: none"> – Röntgen Thorax – CT Hals (mit Kontrastmittel) – CT Thorax (mit Kontrastmittel) – CT Abdomen (mit Kontrastmittel) – PET-CT (Beurteilung unter Verwendung des Deauville-Scores)
Knochenmarkpunktion	<ul style="list-style-type: none"> – Aspirat (Zytologie) – Biopsie (Histologie)

betaHCG bei jungen Frauen,
Kryokonservierung für Frauen und Männer
VOR Therapiestart anbieten

Virologie inklusive HIV, aber auch HBV, HCV, EBV

Auf die Knochenmarkpunktion SOLL bei unauffälligem PET-CT Befund des Knochens verzichtet werden - Der negativ-prädiktive Wert der PET liegt bei 99%.

PET-CT beim HL: Status seit 2022! (<https://www.gba.de/beschluesse/4943/>)

Risk Group	Trial	Treatment modality		Baseline PET	Interim PET	EOT PET	FU
		Chemo-therapy	Radio-therapy				
Early stages	HD10	2x ABVD	IS-RTx 20 Gy (100%)	✓	✓	✓	✗
Intermedi-ate stages	HD17	2x eBEACOPP + 2x ABVD	PET4 guided IS-RTx 30 Gy (16%)	✓	✓	✓	✗
Advanced stages	HD18	PET2 guided 4-6x eBEACOPP	EOT PET guided RT to RD (~ 10%)	✓	✓	✓	✗

		Ann Arbor Stadium				
		IA	IB, IIA	IIB	IIIA, IIIB	IVA, IVB
Keine Risikofaktoren		Frühes Stadium			Fortgeschrittenes Stadium	
Risikofaktoren	≥3 Lymphknotenregionen	Intermediäres Stadium				
	↑ BSG					
	Großer Mediastinaltumor (≥1/3 Thorax)					
	EN-Befall					

GHSG-Risikofaktoren

≥3 Lymphknotenareale

Großer Mediastinaltumor

Die Ausdehnung des Tumors wird an der breitesten Stelle gemessen. Der Thoraxdurchmesser wird auf der Höhe des Zwerchfells gemessen

GHSG-Risikofaktoren

Risikofaktor BSG

Keine B-Symptome:

- Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) von $\geq 50\text{mm/h}$

oder

B-Symptome:

- BSG von $\geq 30\text{mm/h}$

EN-Befall

- lokalisierter Befall eines extralymphatischen Organs
 - oder
- Infiltration eines Lymphknotens in ein extralymphatisches Organ

Lymphatisches Gewebe: Lymphknoten, Milz, Thymus, Waldeyer'scher Rachenring, Blinddarm, Peyer-Plaques.

Therapie

Frühe Stadien

(Empfehlung gilt für PatientInnen im Alter von 18-75 Jahre)

		Ann Arbor Stadium				
		IA	IB, IIA	IIB	IIIA, IIIB	IVA, IVB
Keine Risikofaktoren		Frühes Stadium				
Risikofaktoren	≥3 Lymphknotenregionen					
	↑ BSG					
	Großer Mediastinaltumor (≥1/3 Thorax)					
	EN-Befall					

GHSG HD10:

4x ABVD oder 2x ABVD? 30 Gy IF-RT oder 20 Gy IF-RT?

➤ **2x ABVD + 20 Gy IF-RT ist auch nach 10 Jahren 4x ABVD + 30 Gy nicht unterlegen**

Aber: SIR für Brustkrebs bei Frauen: 4,7 (95% CI, 4,0 - 5,4)

Können Spätfolgen durch PET-gesteuerte Vermeidung einer Strahlentherapie verringert werden?

GHSB HD16: Combined Modality vs. PET gesteuerte Therapie

- Kann bei PET_{EOT}-negativen HL-PatientInnen die RT im Rahmen der Standard-CMT weggelassen werden, ohne dass es zu einem *relevanten* Verlust der Lymphomkontrolle kommt?
- Was ist relevant? Nicht-Unterlegenheitsfragestellung, daher muss untere Grenze definiert werden: 10% PFS Verlust nach 5 Jahren sollen ausgeschlossen werden können.

GHSg HD16: Ist eine PET-gesteuerte Vermeidung einer konsolidierenden RTX ohne Verlust der Lymphomkontrolle möglich?

- Eine Nichtunterlegenheitsgrenze von einer HR 3,01 (entspricht einem Unterschied von 10 % nach 5 Jahren) kann nicht ausgeschlossen werden (CI geht bis -13%)
- Fast identische Ergebnisse zu RAPID und EORTC H10 (!)
- PET-adaptiertes Vermeiden der RT ist nicht möglich ohne Wirksamkeitsverlust: **GHSg HD10 bleibt SOC**

“CMT” oder “chemo alone” beim frühen cHL?

- Einsatz von CMT bei HL im frühen Stadium, weil das Weglassen der RT in unserer Behandlung zu einem Verlust an Wirksamkeit in Bezug auf das PFS führt (HD16, H10, RATHL).
- Es gibt jedoch keinen Unterschied beim OS
- CAVE: Unsere Phase-III-Studien sind nicht leistungsfähig genug, um Schlussfolgerungen zum OS zu ziehen!

Intermediäre Stadien (Empfehlung gilt für PatientInnen im Alter von 18-60 Jahre)

		Ann Arbor Stadium				
		IA	IB, IIA	IIB	IIIA, IIIB	IVA, IVB
Keine Risikofaktoren						
Risikofaktoren	≥3 Lymphknotenregionen	Intermediäres Stadium				
	↑ BSG					
	Großer Mediastinaltumor (≥1/3 Thorax)					
	EN-Befall					

GHSG HD17: Kann man auf die Bestrahlung nach „2+2“ verzichten?

GHSG HD17: Man kann auf die Bestrahlung nach „2+2“ verzichten.

Time [months]	0	12	24	36	48	60
Standard treatment	428	404	363	293	189	111
PET-stratified treatment	477	453	400	320	219	120

5-year PFS [95%-CI]
 Arm A: 97.3% [94.5 - 98.7]
 Arm B: 95.1% [92.0 - 97.0]

Time [months]	0	12	24	36	48	60
Standard treatment	546	518	476	387	258	151
PET-stratified treatment	550	530	483	392	270	152

5-year OS [95%-CI]
 Arm A: 98.8% [96.7 - 99.6]
 Arm B: 98.4% [96.2 - 99.3]

GHSB HD14: Konventionelle Therapieintensivierung mit eBEACOPP.

Figure 1: Kaplan-Meier curves for progression-free survival (PFS), qualified patients. Arm A received 4xABVD+30Gy IFRT; arm B received 2+2+30Gy IFRT. Median observation time was 97 months.

EORTC H10: Eskalation auf 2x eBEACOPP nach Start mit ABVD für PET2-positive PatientInnen?

- Chemotherapie-intensivierung verbessert das PFS, aber
- alle Patienten benötigen eine Bestrahlung und
- Ergebnisse sind numerisch schlechter als in HD17 (Start mit eBEACOPP für alle PatientInnen)

EORTC H10: Therapie des intermediären Stadiums PET-2-negativer PatientInnen: CMT versus Chemo-alone?

F Gruppe: HR < 3.2,
 U Gruppe: HR < 2.1
 (obere Grenze 2.5)

➤ Nichtunterlegenheit kann nicht ausgeschlossen werden!

Fortgeschrittene Stadien (Empfehlung gilt für PatientInnen im Alter von 18-60 Jahre)

		Ann Arbor Stadium				
		IA	IB, IIA	IIB	IIIA, IIIB	IVA, IVB
Keine Risikofaktoren					Fortgeschrittenes Stadium	
Risikofaktoren	≥3 Lymphknotenregionen					
	↑ BSG					
	Großer Mediastinaltumor (≥1/3 Thorax)					
	EN-Befall					

Standard in fortgeschrittenen Stadien? 1960-2000

Standard in fortgeschrittenen Stadien? 2000 - heute

*SOC: some other countries

** ROW rest of world

¹ Herrera et al., ASCO 2023.

² Pinto et al., ICML Lugano 2023

³ Borchmann et al., ICML Lugano 2023

GHSG HD21 remodeling “eBEACOPP” to “BrECADD”

Rationale:

- Erhalt des Kairos-Prinzips und des Chemotherapie-Grundgerüsts (Doxorubicin, Cyclophosphamid, Etoposid)
- Einführung von Brentuximab Vedotin (BV) und damit Wegfall von Bleomycin (B, Lungentoxizität) und Vincristin (V, Neuropathie): Wegfall der d8-Infusion
- Umstellung von Procarbazin (Pr) auf das weniger geno- und gonadotoxische DTIC
- Umstellung von 14 Tagen Prednison (P) auf 4 Tage Dexamethason (D) zur Verringerung des Risikos von steroidbedingten Nebenwirkungen

GHSG HD21: Studiendesign und primäre Endpunkte

Ko-primäre Endpunkte:

- Nachweis einer geringeren behandlungsbedingten Morbidität (TRMB) mit BrECADD
- Nachweis der Nicht-Unterlegenheit von 4-6 x BrECADD im Vergleich zu 4-6 x BEACOPP in Bezug auf das PFS

GHSG HD21: Patienten- und cHL-charakteristika

- 1482/1500 PatientInnen wurden in neun Ländern rekrutiert und 233 Studienzentren sind verfügbar für die PFS Analyse
- TRMB wurde evaluiert bei PatientInnen mit mindestens einem Therapiezyklus

eBEACOPP und BrECADD Kohorten sind balanciert für:

- Stratifizierungsfaktoren (Geschlecht, Alter, IPS, Ort der Rekrutierung)
- Medianes Alter: 31 [18-61] vs 31 [18-61]
- ECOG PS 0: 70% vs 69%
- B-Symptome: 67% vs 68%
- Ann-Arbor Stadium: IIB 16% und III/IV 84%
- Histologie: 55% vs 60% mit Subtyp der nodulären Sklerose

und für PET-basierte Therapiesteuerung

- PET2-negativität: 64% vs 64%
- PET-EOT positive RD: 17% vs 17%

GHSG HD21: Co-primärer Endpunkt TRMB

1. **Signifikante Reduktion von akuten und schwerwiegenden Behandlungsassozierten Nebenwirkungen (TRMB) zwischen allen Subgruppen (IPS, Geschlecht, Alter), mit einem Vorteil von**
 - **BrECADD** (312/738 PatientInnen [42%]) verglichen mit dem SOC
 - **eBEACOPP** (430/732 PatientInnen [59%]), relatives Risiko 0.72; 95% CI 0.65–0.79, $p < 0.0001$
2. Die beobachtete signifikante Reduktion der akuten TRMB ist **klinisch bedeutsam** mit einer Reduktion von
 - **Tranfusionshäufigkeit** für Erythrozytenkonzentrate (von 52% mit eBEACOPP auf 24% mit BrECADD) und Thrombozyten (von 34% auf 17%), und
 - **Peripherer sensorischer Neuropathie** Grad 2 (3) von 14% (2%) auf nur 6% (1%)
 - BrECADD: BV Stop 2% versus eBEACOPP VCR Stop 18%
3. **Erholung der TRMB-Events nach 12 Monaten** in 675/677 Patienten (> 99%), welche mit BrECADD behandelt wurden

HD21: Verträglichkeit beeinflusst Dosierung beeinflusst Effektivität

patients treated with *full dose* (cyclo, etoposide, doxo) *per cycle* (%)

Early termination of the tubulin inhibitors VCR and BV in BrECADD **18/738 patients** **2.4%**

VCR in eBEACOPP: **132/732 patients** **18.0%**
 Δ **15.6%**

PFS events at interim analysis

	eBEACOPP N=740		BrECADD N=742	
	n	%	n	%
Progression/Relapse	55	7.4	32	4.3
Progression	14	1.9	5	0.7
Early Relapse, FU <= 1 year	23	3.1	11	1.5
Late Relapse, FU > 1 year	18	2.4	16	2.2
Death without PRO or REL	6	0.9	7	0.9
PFS events, total	61	8.4	39	5.3

Reduction of early PFS events with BrECADD, NI was concluded at IA

GHSG HD21: Co-primärer Endpunkt Wirksamkeit (PFS)

Nicht-Unterlegenheit wurde bei Zwischenanalyse nach 36 Monaten gezeigt, mit 4 Jahren mFU wurde dann Überlegenheit getestet: BrECADD ist eBEACOPP überlegen.

GHSG HD21: Der Benefit von BrECADD gilt auch für Risiko-PatientInnen

PFS in Abhängigkeit vom PET2

	0	6	12	18	24	30	36	42	48
BEACOPP neg. DS 1-3	430 (0)	426 (2)	412 (7)	399 (11)	386 (19)	377 (27)	345 (59)	280 (121)	218 (183)
BEACOPP pos. DS 4-5	239 (0)	229 (4)	219 (7)	211 (12)	206 (15)	200 (19)	183 (34)	143 (72)	106 (107)
BrECADD neg. DS 1-3	430 (0)	422 (5)	413 (8)	408 (13)	399 (20)	382 (37)	349 (70)	279 (139)	209 (208)
BrECADD pos. DS 4-5	247 (0)	241 (4)	231 (10)	226 (11)	217 (13)	206 (22)	190 (38)	162 (64)	121 (104)

PFS für PET2 positive BrECADD PatientInnen in Abhängigkeit von PET6

	0	6	12	18	24	30	36	42	48
CR	165 (0)	164 (1)	158 (6)	154 (7)	150 (7)	143 (13)	134 (22)	113 (41)	90 (64)
PR PRO	75 (0)	74 (0)	71 (0)	70 (0)	65 (2)	61 (5)	54 (12)	48 (18)	30 (35)

GHSG HD21: Gonadale Funktion bei Frauen

**Signifikant verbesserte gonadale Funktion
gemessen an FSH-Erholung mit BrECADD**

- **HR 1.73**, CI95: 1.37-2.19, Erholungsrate mit BrECADD 95% (vs 72% mit eBEACOPP)
- Kein relevanter Einfluss von der Zahl der Zyklen mit BrECADD
- Kein relevanter Einfluss des Alters (bis 40 Jahre)

GHSG HD21: Gonadale Funktion – Vergleich mit ABVD

ABVD (in RATHL)

BrECADD in HD21

▶ Die Erholung der Gonadenfunktion nach BrECADD ist relativ sehr ähnlich wie nach ABVD und absolut (95%) sehr gut.

GHSG HD21: Gonadale Funktion bei Männern

Men: Time to recovery of FSH (n=420)

Signifikant verbesserte gonadale Funktion gemessen an FSH-Erhholung mit BrECADD

- HR 3.33, CI95: 2.54-4.37, Erholungsrate mit BrECADD 86% (vs 39% mit eBEACOPP)
- Geringer Einfluss von der Zahl der Zyklen mit BrECADD
- Geringer Einfluss des Alters (bis 50 Jahre)

15 U/L

Therapie des cHL bei Patienten ≤ 60 Jahre

Standard in fortgeschrittenen Stadien? 2000 - heute

*SOC: some other countries

** ROW rest of world

¹ Herrera et al., ASCO 2023.

² Pinto et al., ICML Lugano 2023

³ Borchmann et al., ICML Lugano 2023

Immunchemotherapie in fortgeschrittenen Stadien

SWOG S1826 Studie

SWOG S1826: Nivolumab-AVD bei älteren Patienten (über 60 Jahre)

	N-AVD (48)	Bv-AVD (49)
G-CSF	69%	92%
1-Jahres PFS	93%	64%
1-Jahres EFS	93%	57%
1-Jahres OS	95%	83%

Figure: Progression-Free Survival for Patients Aged ≥ 60 years Enrolled on S1826.

BrECADD Daten für diese PatientInnen sind sehr bald verfügbar (ISHL/ASH 24)!

Therapie des cHL bei Patienten > 60 Jahre

Nachsorge

- Junge PatientInnen (< 35 Jahre) können eine spezialisierte REHA in Anspruch nehmen
- Bildgebung mittels PET/CT soll nach Erreichen einer mCR nicht mehr wiederholt werden.
- Bildgebung mittels PET/CT oder CT für PatientInnen, die keine mCR erreicht haben, kann 3 -12 Monate nach Therapieende und bis zum Erreichen einer (m)CR durchgeführt werden. CAVE: PET im Strahlenfeld schwierig zu beurteilen.
- Regelmäßige PET/CT oder CT-Untersuchungen, d.h. ohne Verdacht auf Progress/Rezidiv, sind bei Pat. in der Nachsorge nicht routinemäßig indiziert

Was ist neu?

- BrECADD als neuer Therapiestandard für Patient:innen bis 60 in fortgeschrittenen Stadien - ausgenommen NLPHL – hier bleibt BEACOPPesc. Standard
- Das Feld ist im Fluss, Stellenwert der ICI wird evaluiert und könnte zukünftig auch in der Erstlinie eine wertvolle Option sein.
- Bei den > 60 jährigen PatientInnen in fortgeschrittenen Stadien kommt auch Bewegung ins Feld

B. T., männlich, Jahrgang 1998

PET 0

Körperliche Untersuchung:

Lymphadenopathie cervical links, nuchal rechts, mediastinal, inguinal

Histologie:

Klassisches Hodgkin-Lymphom vom Typ der nodulären Sklerose (EBV-negativ)

Therapie:

Start mit 4-6x BrECADD (PET2-adaptiert) + 30 Gy RT PET-positiver Reste, nach 2 Zyklen noch PET-positiv, 6 Zyklen werden appliziert

B. T., männlich, Jahrgang 1998

A) Nach 6 Zyklen BrECADD liegt noch ein mediastinaler Rest von 3 cm vor (DS3)

1. Bestrahlung (30 Gy RT)
2. PET/CT Nachkontrolle in etwa drei Monaten
3. Einleitung einer histologischen Sicherung
4. Bei mCR und guter Prognose ist keine weitere Nachsorge erforderlich

B. T., männlich, Jahrgang 1998

Der Patient ist nun in CR und fragt Sie, ab wann er ungeschützten Geschlechtsverkehr (bei Kinderwunsch) haben kann

1. Nach 3 Jahren
2. Nach 1 Jahr
3. Es gibt keinen Hinweis für genetische Schäden des Föten nach Chemotherapie des Vaters unabhängig vom Zeitpunkt der Zeugung. Ich empfehle also im Hinblick auf diesen Aspekt keine Karenzzeit.

B. T., männlich, Jahrgang 1998

PET 2

Das PET nach 6 Zyklen beschreibt einen mediastinalen Rest mit Deauville Score von 4 und eine neue PET-avide Läsion li mediastinal – Was tun Sie?

1. Einleitung einer Rezidivtherapie mit Salvage und HD-ASCT
2. Umstellung auf PD1-CTx Kombi (z.b. Pembro GVD), ggfs HDCTx im Verlauf
3. Modalitätenwechsel auf Bestrahlung (IS-RT)
4. Einleitung einer histologischen Sicherung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GHSG Chairman: P. Borchmann

Former Chairman: A. Engert

Honorary Chairman: V. Diehl

Pathology: F. Fend, M.L. Hansmann, W. Klapper, G. Ott, A. Rosenwald

Radiotherapy: C. Baues, H. T. Eich

Nuclear Medicine: M. Dietlein, C. Kobe

Laboratory: S. Borchmann

Physicians: K. Behringer, B. Böll, P. Bröckelmann, D. Eichenauer, J. Ferdinandus, S. Gillessen, A.S. Robertz, B. v. Tresckow, J. Welters

Head GHSG Trial Coordination Center: M. Fuchs

Trial physician: H. Tharmaseelan

Data Management: B. Andrulavicius, B. Koch, S. Ladewig, B. van den Hoonard

Project Management: S. Kreitz, N. Moroz, A. Müller, I. Oosterhaar, S. Sevimli-Abdis, M. Weber, L. Wolf

Quality Management: I. Oosterhaar

Database / IT: O.W. Abudu, L. Ganß, T. Schober

Statistics: I. Bühnen, J. Jablonski, H. Kaul, G. Schneider

Assistance / Secretary: K. Rust, M. Schumacher, K. Tittmann

onkopedia

Das Leitlinienportal

Online und als App

www.onkopedia.com

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR
HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

**DGHO-Mitglied
werden - für vollen Zugriff
auf alle Onkopedia-Inhalte
www.dgho.de/mitglied-werden**