Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patientinnen und Patienten nach autologer SZT

https://doi.org/10.4126/FRL01-006529039

Impfung	Zeitpunkt nach auto-SZT	Schema / Empfehlung	Hinweis
COVID-19	Ab 3 Monate	Grundimmunisierung (3 Dosen, unabh. von Saison) plus weitere Booster gemäß aktueller Empfehlung und Risikoprofil	Nationale Empfehlungen beachten
Influenza		Jährliche Impfung, bevorzugt September/Oktober	Bei ausgeprägter Immunsuppression Booster nach 4–6 Wochen erwägen
RSV		Einmalige Impfung	Standard für ≥60 Jahre; individuelle Kostenübernahme bei Jüngeren prüfen

Mellinghoff SC, Liss B, Stemler J … Rieger CT. Ant-infective vaccination strategies in patients with haematological malignancies or solid tumours: updated guideline of the Infectious Diseases Working Party of the German Society for Hematology and Medical Oncology. Lancet Oncol 2026;27: e195 - 206

DGHO
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HÄMATOLOGIE UND MEDIZINISCHE ONKOLOGIE

Impfempfehlung für die Hämatologie und Onkologie

Patientinnen und Patienten nach autologer SZT

https://doi.org/10.4126/FRL01-006529039

Impfung	4 Monate	6 Monate	12 Monate	24 Monate	Hinweis
Diphtherie/Tetanus/Pertussis/Polio (Tdap-IPV)		✓			Beginn der Revakzinierung
Hepatitis B	✓				Bei verfügbarer Kombinationsimpfung gemeinsam mit Hepatitis A
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)	✓				Standardrevakzinierung
Pneumokokken	✓	✓	✓	✓	PCV20
Herpes Zoster (Shingrix®)	✓	✓			2 Dosen; empfohlen bei Zosterfreiheit seit ≥6 Monaten
Meningokokken (ACWY + B)			✓		Bei entsprechender Indikation
MMR (Masern-Mumps-Röteln)				✓	Titerkontrolle erwägen; Impfung bei fehlender Immunität

Mellinghoff SC, Liss B, Stemler J … Rieger CT. Ant-infective vaccination strategies in patients with haematological malignancies or solid tumours: updated guideline of the Infectious Diseases Working Party of the German Society for Hematology and Medical Oncology. Lancet Oncol 2026;27: e195 - 206