

FOLFOXIRI bei metastasiertem Kolonkarzinom

Falcone, A. et al. Journal of Clinical Oncology, Vol 25, No 13 (May 1), 2007: pp. 1670-1676. Phase III Trial of Infusional Fluorouracil, Leucovorin, Oxaliplatin, and Irinotecan (FOLFOXIRI) Compared With Infusional Fluorouracil, Leucovorin, and Irinotecan (FOLFIRI) As First-Line Treatment for Metastatic Colorectal Cancer: The Gruppo Oncologico Nord Ovest

Patient: _____ geb.: _____
 Größe (cm): _____ Gewicht (kg): _____ Körperoberfläche (m²): _____
 Kurs Nr. _____ ab: _____ Wdh. Tag 15 – geplant ab: _____ angeordnet: (Arztunterschrift)

Medikament	Dosis	Appl.	Anmerkung	Tag 1 (gegeben Uhrz/HZ)	Tag 2
Irinotecan 165mg/m ²			Über 90min	X	
Oxaliplatin 85mg/m ²		i.v.	Infusomat; Infusion 500ml G5%, 2h *	X	
Calcium 10% 10 ml + Mg-5-Sulfat 10% 10 ml In 100 ml G5%	120ml	i.v.	je einmal vor und nach Oxaliplatin	X	
Folinsäure 200mg/m ² In Glukose 5%		i.v.	Infusion über 2h in Beutel mit G5%, parallel zu Oxali	X	
5-FU 3200mg/m ²		i.v.	Baxter 48h-Pumpe	X	
Atropin	1/2A.	s.c.	30min vor Irino	X	
Ondansetron	8mg	i.v. Bolus	vor Chemo	X	
Dexamethason in 100 ml NaCl 0,9% als Kurzinfusion	8mg	i.v. 15min	vorweg	X	

*** vor und nach Oxaliplatin mit 20ml Glukose 5% den Port spülen**